

isuprel

Magnesium sulfuricum

Calcium glukonicum

Furosemid

Dexamed

Diazepam (desitin)

Dicynone

Rectodelt

<p>Farmak. Skupina: k substituci hořčíku myorelaxans</p> <p>Indikace: EPH gestóza, thyreotoxikoza, eklampsie</p> <p>Kontraindikace: hypermagnezemie, svalová hypotonie</p> <p>Podání: i.v. 1-2 amp. pomalu děti: 10 mg/kg</p> <p>Zvláštnosti: nekombinovat s digitalisem</p>	<p>Farmak. Skupina: sympatomimetikum</p> <p>Indikace: asystolie, symptomatická bradykardie</p> <p>Kontraindikace: AIM, kardiomyopatie</p> <p>Podání: KPR s asystolií 0,2 mg i.v. 1-3 mg ve 250 ml F1/1</p> <p>Zvláštnosti: podávat co nejkratší dobu</p>
<p>Farmak. Skupina: diuretikum antihypertenzivum</p> <p>Indikace: edém plic, mozku, hypertenze, kardiální a nekardiální selhání</p> <p>Kontraindikace: gravidita, hypokalémie, akutní glomerulonefritida</p> <p>Podání: i.v. 40-80 mg – pomalu děti: 1-3 mg/kg/den</p> <p>Zvláštnosti:</p>	<p>Farmak. Skupina: antialergikum k substanci kalcia</p> <p>Indikace: zvýšená potřeba Ca, tetanie, alergické reakce, osteomalacie</p> <p>Kontraindikace: hyperkalcemie</p> <p>Podání: i.v. 1 amp. velmi pomalu</p> <p>Zvláštnosti: při rychlém podání riziko kolapsu z vazodilatace, nepodávat současně s kardiotoniky</p>
<p>Farmak. Skupina: antiepileptikum anxiolytikum</p> <p>Indikace: EPI, záchvaty, křečové stavy, úzkost</p> <p>Kontraindikace: my astemia gravis, intoxikace alkohol., analgetiky</p> <p>Podání: rektálně děti: do 15 kg – 5 mg nad 15 kg – 10 mg</p> <p>Zvláštnosti: nepodávat dětem do 6-ti měsíců</p>	<p>Farmak. Skupina: hormon glukokortikoid</p> <p>Indikace: alergie, edém mozku, šokové stavy</p> <p>Kontraindikace: žalud. Vředy, kardiální dekompenzace, renální insuficience</p> <p>Podání: i.v. Individuální i.m. zvolna</p> <p>Zvláštnosti:</p>
<p>Farmak. Skupina: hormon glukokortikoid</p> <p>Indikace: alergické reakce, laryngitida, astma bronchiale, Quinkeho edem</p> <p>Kontraindikace:</p> <p>Podání: děti: 5-20 mg/kg</p> <p>Zvláštnosti:</p>	<p>Farmak. Skupina: antihemorhagikum hemostatikum</p> <p>Indikace: hemateméza, hematurie, melena, gynek. krvácení</p> <p>Kontraindikace: první trimestr, laktace</p> <p>Podání: 1-2 amp. i.v./i.m. Děti: ½ dávky</p> <p>Zvláštnosti:</p>