

Tracrium

F1/1

R1/1 (Ringer laktát)

G10%

G40%

NaHCO₃

Manitol

Voluen 6%

<p>Farmak. Skupina: izotonický roztok Indikace: nosný roztok pro léky, deplece sodíku Kontraindikace: hyperhydratace hypernatrémie dekompenzace srdeč. poruch a fce ledvin Podání: i.v. Infuze 2-4ml/kg/hod 2-3 l/2-3 hod při těžkém deficitu Zvláštnosti: při aplikaci většího množství monitorace centrálního žilního tlaku</p>	<p>Farmak. Skupina: nedepolarizující myorelaxanc Indikace: svalová relaxace během celkové nestezie Kontraindikace: myasteniagravis astma bronchiální Podání: 0,5-0,6 mg/kg i.v. Po ETI Zvláštnosti: zrušení neostigminem za současného podání atropinu</p>
<p>Farmak. Skupina: roztok glukózy Indikace: nosný roztok pro léky hypoglykémie ketoacidóza Kontraindikace: hyperglykemie hyperosmolarita poruch fce ledvin Podání: i.v. Infuze ze 2-4 ml/kg/den, celkem 500-1000 ml/den Zvláštnosti:</p>	<p>Farmak. Skupina: krystaloidní roztok Indikace: izotonická dehydratace lehká metabolická alkalóza doplnění intravaskulárního objemu Kontraindikace: hyperhydratace hypernatrémie hypokalémie dekompenzace srdeční porucha a fce ledvin Podání: i.v. Infuze 2-4 ml/kg/hod, průměrná denní dávka 500-1500ml Zvláštnosti: při aplikaci většího množství monitorace centrálního žilního tlaku</p>
<p>Farmak. Skupina: roztok k terapii acidózy Indikace: diabetická ketoacidóza RES šok, hypoxie intoxikace salicyláty, ethylenglykol Kontraindikace: respirační acidoza poruchy ventilace hypernatrémie Podání: i.v. infuze Zvláštnosti: další dávkování podle lonogramu a vyšetření acidobazické rovnováhy</p>	<p>Farmak. Skupina: roztok glukózy Indikace: hypoglykemické koma ketoacydóza Kontraindikace: hyperglykemie hyperosmolarita porucha fce ledvin Podání: i.v. Infuze 0,5 ml/kg/den, celkem max. 500ml/den Zvláštnosti: Nepodávat do periferie (flebitidy)</p>
<p>Farmak. Skupina: plazmaexpander Indikace: hemorhagický šok hypovolemie Kontraindikace: přecitlivění na úč. Látku dekompenz. Srdeč. Insuficience porucha fce ledvin poruchy hemokoagulace Podání: i.v. Infuze dle stavu pacienta dospělí: 500-1000ml/den děti: 20 ml/kg/den Zvláštnosti:</p>	<p>Farmak. Skupina: osmotický aktivní roztok Indikace: osmotické diuretikum Antiedematózní th. při traumatech mozku, míchy glaukom Kontraindikace: těžká hypertenze dehydratace dekompenz. Srdeční insuficience Podání: i.v. Infuze dle stavu pacienta Zvláštnosti: opatrně při intracranialním poranění</p>

